

syngenta®

Arto Markkula

Arto Markkula 24.5.2007
Syngenta Crop Protection A/S



Syysviljat ja siemenheinä

Rukiilla korrenlyhennys tehdään lippulehtivaiheessa

MODDUS M –

valmisteella. Amilo-lajikkeella käytetään alempia ja muilla lajikkeilla suurempia annoksia, typpilannoituksesta riippuen. Ruosteen torjumiseksi voi samaan seokseen laittaa.

AMISTAR + ZENIT (esim. 0,3+0,3 l/ha).

Syysvehnällä esiintyy DTR-lehtilaikkua suorakylvetyillä ja pintamuokatuilla lohkoilla etenkin, jos esikasvina on vehnä. Sopivissa oloissa DTR leviää nopeasti ja tuhoaa yhteyttävää lehtipinta-alaa. Puolikas annos Zenit-valmistetta rikkakasviruiskutuksen yhteydessä riittää alkuvaiheessa. Vehnän tähkä suojataan Amistar + Zenitillä tähkän tullessa esiin.

Siementimotein ja nurminadan kasvunsäätö hoidetaan

MODDUS M:llä.

Käyttöaika on heinän 1-2-solmuvaiheessa. Käyttömäärä on 0,6-0,8 l/ha. Annoksen voi myös jakaa (0,4+0,4 l), toinen käsittely tehdään noin viikon kuluttua ensimmäisestä. Myös siemenheinille voi antaa tautisuojan

Amistar + Zenit –seoksella.

KIRPPAVAROITUS !

Taimettumisvaiheessa olevissa rypsissä ja rapsissa on havaittu runsaasti kirppoja. Nykyisillä peittäusaineilla ei ole hajuun perustuvaa karkotusvaikutusta, vaan ne tehoavat kirppoihin niiden haukatessa tainta. Muutama näin syntynyt reikä ei ole taimelle haitallista, mutta nyt kirppoja on niin paljon, että niiden yhteisvaikutus on liikaa pienelle taimelle. Etenkin aikaisin kylvetyissä pintamuokatuissa ja suorakylvetyissä lohkoissa on kirppoja paljon. Tarkista tilanne pellolla ja tarpeen niin vaatiessa

ruiskuta **KARATE** 0,15-0,2 kg/ha.

KARATE 2,5 WG

Lue aina kasvinsuojeluaineiden käyttöohjeet ja noudata niitä. Käyttöohjeet ja käyttöturvallisuuksiedotteet:

www.agrimarket.fi

AGRI MARKET

Kemira GrowHow'n ja Agrimarketin Kasvuohjelmaneuvonta
Kasvukaudella päivittäin klo 8.00–19.00.

puh. 010 76 83110